



COLONOSCOPIE

GASTRO-ENTÉROLOGIE

dr. Schoonjans
dr. Ghillemin
dr. Van Imschoot
dr. Annelien Van Driessche

**SECRETARIAT
MEDECINE INTERNE**
055/23 36 68

absl Werken Glorieux | ch Glorieux
Avenue Glorieux 55, B-9600 Ronse
T 055 23 30 11, F 055 23 30 22
www.azglorieux.be, info@azglorieux.be

24.11.16
INW02.F

BUT DE L'EXAMEN

Cet examen permet de repérer toute anomalie du côlon (gros intestin) et le cas échéant, de prélever des échantillons pour en faire l'analyse au microscope. Lors de cet examen, on découvre parfois des polypes (risque de cancérisation) qui, dans la mesure du possible, seront enlevés en même temps.

PREPARATION

Pour que l'examen se déroule dans de bonnes conditions, il faut que le gros intestin soit parfaitement propre. Il faut donc suivre à la lettre les instructions qui vous seront données (régime, laxatifs). Informez le médecin de vos allergies et de vos médicaments, en particulier ceux qui modifient la coagulation du sang: Aspirine, Sintrom, Marevan, Marcoumar, Plavix et Ticlid. Il vous sera éventuellement permis de prendre vos médicaments habituels mais conformez-vous à l'avis du médecin.

DEROULEMENT DE L'EXAMEN

L'examen, pouvant être très désagréable, nécessite une anesthésie générale réalisée en collaboration d'un anesthésiste. Celui-ci vous injectera un produit laiteux dans la veine qui vous endormira dans la minute. L'endoscope, un tube souple relié à une caméra, est introduit

par l'anus dans le gros intestin pour visualiser le côlon et l'extrémité de l'intestin grêle. Des biopsies peuvent être prises et des polypes éventuellement enlevés. L'examen peut durer 10 à 30 minutes. Après l'examen, vous êtes reveillé(e) pratiquement instantanément, bien qu'une période de 30 minutes peut s'écouler avant d'être tout à fait conscient.

ATTENTION

Si vous avez reçu un calmant, la conduite d'un véhicule ou tout acte dangereux est interdit le jour de l'examen. Les calmants peuvent affecter vos réflexes ou votre jugement durant le reste de la journée.

EPIPHENOMENES

Il est aussi conseillé de ne pas rester seul durant les heures qui suivent l'examen. Si, de retour à domicile, vous présentez dans les heures qui suivent (ou même les jours qui suivent) une douleur intense ou inhabituelle, une perte de sang importante par l'anus ou de la fièvre, prévenez votre médecin traitant, votre gastro-entérologue ou le service d'urgence de l'hôpital.



PRECAUTIONS ET RISQUES

La colonoscopie est un examen présentant peu de risques. Cependant, aucun médecin ne peut garantir le succès ou l'absence de risques, liés à son intervention. Un maximum de précautions sont prises pour minimiser les inconvénients et risques. Les instruments et accessoires sont désinfectés et stérilisés avant leur utilisation (dans notre centre après chaque utilisation, de façon standardisée et machinale). Il existe un faible risque (< 1%) de perforation ou d'hémorragie, surtout quand un polype est enlevé. La résection d'un polype, trouvé lors de l'examen, est en général nécessaire. Si le gastro-entérologue juge le risque trop élevé, il vous proposera une intervention chirurgicale. En cas de complication, une hospitalisation sera nécessaire et le traitement sera parfois chirurgical.

ALTERNATIVE

La colonoscopie est la meilleure méthode d'examen du côlon. D'autres examens sont possibles (radiographie du côlon par lavement baryté). Ils ne permettent pas de prélever des échantillons ou d'enlever des polypes.

EN CAS DE REFUS

Si l'examen que votre médecin a proposé n'est pas réalisé, cela peut influencer le diagnostic de la maladie et avoir des conséquences néfastes.

POUR FINIR

Si, après la lecture de ce folder, vous avez encore des questions, posez les quand vous arrivez au service avant votre examen. Le médecin est à votre disposition pour toute information complémentaire.

Ce texte a été rédigé conformément aux directives de la Société Belge d'Endoscopie Digestive.

RENDEZ-VOUS

Date:

Heure:

Service:

Si, en raison de circonstances imprévues, l'examen ne peut se dérouler, prière d'avertir le service le plus rapidement possible.

Tél. Secrétariat Médecine interne:
055/23 36 68